



ENCONTREI UM MÃO- PELADA!



MÃO- PELADA

Procyon cancrivorus

PRESERVE A FAUNA SILVESTRE

PRATICAR ATO DE ABUSO OU MAUS-TRATOS, OU FERIR, OU MUTILAR ANIMAIS SILVESTRES, DOMÉSTICOS OU DOMESTICA-DOS, NATIVOS OU EXÓTICOS, AINDA QUE POR NEGLIGÊNCIA, É CRIME (LEI Nº 9.605/1998).



Não ofereça alimento, nem se aproxime demais, o mão-pelada pode se sentir ameaçado. Devemos respeitar seu espaço.

Caso ele esteja ferido ou em risco iminente, entre em contato com as autoridades ambientais e não deixe animais domésticos se aproximarem.



O lixo, especialmente o orgânico, deve ser bem acondicionado, pois é o principal fator que atrai mãos-peladas para ambiente não naturais, expondo a espécie a riscos.



**SECRETARIA
MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE E
PLANEJAMENTO**

4622-7535

smmap@santanadeparnaiba.sp.gov.br

**AUTORIDADES
AMBIENTAIS**

GCM AMBIENTAL • 4156-6400

PM AMBIENTAL • 4789-0905



PREFEITURA DE
**SANTANA
DE PARNAÍBA**

QUEM É O MÃO-PELADA?

É um mamífero de porte médio da família dos procionídeos, que pode chegar a 1 metro de comprimento e pesar 10 kg. Também é chamado de guaxinim sul-americano. Possui a cauda longa anelada e patas com 5 dedos com unhas não retráteis. No Brasil há apenas 4 espécies da família Procyonidae: o mão-pelada, o quati (*Nasua nasua*), o jarapuí (*Potos flavus*) e o olingo (*Bassaricyon gabbii*).

O mão-pelada é um animal solitário e terrestre, que preferencialmente vive próximo a fontes de água. Apesar disso, também é registrado em habitats não-aquáticos em determinadas épocas do ano.

Ele é muito parecido com a espécie norte-americana, o "raccoon" (*Procyon lotor* - ver imagem ao lado), onde a diferença é que a espécie brasileira apresenta as pernas mais longas e os pelos mais curtos do que a espécie norte-americana.

OCORRÊNCIA

Encontrado em todos biomas brasileiros e na América Central, onde ocorre junto com o "raccoon", espécie norte-americana.

Ocorre em florestas, campos, manguezais, entretanto, a espécie é rara ou sofre grandes flutuações populacionais na Amazônia.



Guaxinim norte-americano (*Procyon lotor*), muito parecido com a espécie brasileira (*Procyon cancrivorus*), distinguindo-se pela pelagem mais comprida e as pernas mais curtas.

ALIMENTAÇÃO

É onívoro, alimenta-se de frutas de embaúba, jerivá, araticum e guaríroba, agindo também como dispersor de sementes. Pequenos roedores, aves, anfíbios, peixes, moluscos, e insetos também fazem parte da dieta. Nos mangues, os crustáceos são a principal fonte de alimento da espécie.

Quando há abundância de alimentos de origem antrópica, como comedouros e lixeiras, pode passar a se alimentar principalmente disso.

COMPORTAMENTO

Noturno e semi-arborícola, passando tempo significativo nas árvores. Abrigos para a espécie podem ser em árvores, ocos de árvores, tocas, ou ainda em bromélias e touceiras de capim. A área de vida de um mão-pelada pode chegar a cerca de 7 quilômetros quadrados, mas não são territorialistas, tolerando outros mãos-peladas.

MAIORES AMEAÇAS À ESPÉCIE

É acometida com doenças de animais domésticos como raiva, cinomose, parvovirose e leptospirose. Ademais, sofre com a caça para uso da pele, atropelamentos e ataques de animais domésticos.

A população de guaxinins está em declínio devido à destruição de florestas pluviais e mangues e à poluição hídrica de forma geral.